



## ALGEMENE SLEUTEL

- **Duifkruid** lijkt sterk op **Beemdkroon**. Het onderscheid tussen beide ligt in de bloemhoofdjes. De bloem van Beemdkroon heeft een kelk met zeer korte tanden, Duifkruid daarentegen heeft een kelk met 5 lange donkere tanden (borstels).



**Duifkruid**  
(*Scabiosa columbaria*)



**Beemdkroon**  
(*Knautia arvensis*)

# Duifkruid (*Scabiosa columbaria*)

## Familie

kaardebolfamilie (*Dipsacaceae*)

## Diagnostische kenmerken

Zoom van het bijzonder omwindsel breed, uitstaand, vliezig.

Bloemen roodachtig lila, zelden wit, in 1,5-3,5 cm brede hoofdjes.

Onderste bladen liervormig veerlobbig tot -delig, met grote eironde eindslip; de volgende bladen fijner gedeeld, 1 of 2 maal veerspletig of -delig, met smalle, bijna lijnvormige slippen.

Vrucht met 5 kelknaalden.

## Hoogte bloeiende plant

10 - 60 cm.

## Bloeitijd

Juli - oktober

## Levensvorm

Rozthemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond).

## Standplaats

Droge graslanden en hellingen, soms rotsen; kalkminnend en thermofiel.



## Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	1	1
●	1971-'94	16	16
●	1995 - ...	3	3



# Beemdkroon (*Knautia arvensis*)

## Familie

kaardebolfamilie (*Dipsacaceae*)

## Diagnostische kenmerken

Stengel door zeer korte haren grijsgroen, door langere haren stijf behaard.

Bladen grijsgroen, de bovenste meestal veerspletig of -delig, de onderste meestal ongedeeld, zelden alle veerspletig.

Bijzonder omwindsel ruw behaard, afgeplat vierkantig, kort getand.

Ranbloemen meestal stralend.

Bloemkroon 4-spletig, lila, zelden wit, zeer zelden geel.

Vrucht met 8 kelknaalden.

## Hoogte bloeiende plant

30 - 60 cm.

## Bloeitijd

Juni - september

## Levensvorm

Rozethemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond).


## Standplaats

Weiden, taluds, bermen; thermofiel en vrij kalkminnend.



## Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	1	1
●	1971-'94	237	237
●	1995 - ...	81	81



# Blauwe knoop (*Succisa pratensis*)

## Familie

kaardebolfamilie (*Dipsacaceae*)

## Diagnostische kenmerken

Onderste bladen langwerpig of lancetvormig, gaafrandig, de bovenste lancetvormig, gaafrandig, zelden grof getand.

Bloemhoofdjes halfbolvormig, later bolvormig.

Bijzonder omwindsel ruw behaard, met 4 eironde, spitse en stekelpuntige tanden.

Kelk met (4 of) 5 borstels.

Bloemkroon blauw, zelden geelachtig wit of roodachtig, soms heldergeel.

## Hoogte bloeiende plant

30 – 80 (– 100) cm.

## Bloeitijd

Juli - oktober

## Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond).


## Standplaats

Onbemeste, vochtige weiden en heiden, kapvlakten, bospaden, vooral op slecht doorlatende bodem, vaak met Pijpenstrootje.



## Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	3	3
●	1971-'94	158	158
●	1995 - ...	20	20



# Zandblauwtje (*Jasione montana*)

## Familie

klokjesfamilie (*Campanulaceae*)

## Diagnostische kenmerken

Meestal verscheidene stengels bijeen, deze onderaan bebladerd en evenals de bladen ruw behaard, naar boven onbebladerd en kaal.

Bladen gaafrandig, min of meer met gegolfde rand, de onderste smal omgekeerd eirond, stomp, de bovenste lancet- tot lijnvormig, vrij spits. Bloemkroon hemelsblauw, zelden wit of roodachtig.

## Hoogte bloeiende plant

10 - 35 cm.

## Bloeitijd

Juni - september

## Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond).

## Standplaats

Vrij zure zandgronden, droge heiden, braakland, schieferhellingen.



## Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	3	3
●	1971-'94	291	291
●	1995 - ...	66	66

